I Disturbi del Comportamento Alimentare: una nuova pandemia?

Armando Cotugno

UOSD Disturbi del Comportamento Alimentare

Dipartimento di Psichiatria

ASL Roma 1

armando.cotugno@aslroma1.it

Valentina

Un caso paradigmatico

Figlia unica, brava a scuola, aspetti d'ansia e insicurezza sociale, fa danza dall'età di 4 anni, 13aa

Marzo 2020 - 1°Lockdown, III media, isolamento, DaD, leggero incremento ponderale

Giugno 2020 - Diploma terza media, passa l'estate con amici e genitori

Settembre 2020 - 2°Lockdown, inizio liceo, ansia scolastica, attacchi di panico, crescente senso d'incertezza personale, flessione dell'umore

Novembre 2020 - Infezione da Covid di entrambi i genitori, ansia e incertezza, leggera inappetenza e leggero dimagrimento (1 kg)

Dicembre 2020 - Medico sportivo: rinforzo del peso: senso di gratificazione, inizia a restringere volontariamente

Febbraio 2021 - Bradicardia, frequenti lipotimie, perdita di 13 KG in 6 settimane

Marzo 2021 - Ricovero presso l'OPBG (25 gg) NE via SNG

Cosa sappiamo dei DNA

I DNA sono malattie gravi, pericolose e difficili da curare

UOSD
DCA

Sono disturbi che hanno una complessità psicologica e una complessità biologica.

Complessità Psicologica

Transdiagnostica: Frequenti transizioni tra i diversi quadri nosografici

Fragilità dell'Identità Personale: Senso pervasivo d'inefficacia personale

Nucleo psicopatologico comune: Ipervalorizzazione del peso e delle forme corporee

Strategie cognitive-comportamentali: Ipercontrollo ed Evitamento emotivo-interpersonale

Comorbidità: Frequenti comorbidità psichiatriche (spettro autistico, impulsivo, ossessivo, depressive)

Complessità Medico-Internistica

frequente compromissione di vari distretti dell'organismo (cardio-circolatorio, osseo, gastroenterico, endocrinologico, ginecologico e neuropsicologico)

Dati di Prevalenza dei DAN

Hudson, 2007; Crow et al., 2009; Steinhausen, 2009; Gigantesco, 2010; Swanson, 2011;
Quaderni della Salute, MinSan, 2013; Rapporto ISTISAN, 2013; Keski-Rahkonen & Mustelin, 2016; Smink, Van Hoeken, & Hoek, 2012; Udo
& Grilo, 2018)

Prevalenza DA Popolazione Generale

5% - 15%

AN

- 0,1% - 0,3% U
- 0,9% - 2,3% D (**2,5%**)

BN

- 0,1% - 0,8% U
- 1,3% - 2,5% D (**4,5%**)

BED

- 0,4% - 2,3% U
- 1,5% - 4,5% D (**6%**)

DA NAS

- 0,7% - 2,5%

Incidenza DA in GB Periodo 2000-2009

Tasso d'incidenza per tutte le diagnosi DA
(n=9072; età=10-49)
Aumento da 32.3 a 37.2 per 100 000
I tassi d'incidenza per **AN** e **BN** sono risultati
stabili, mentre quelli di **DAI** e **DANAS** sono
sensibilmente aumentati
Massima incidenza femminile: età 12-16
Massima incidenza maschile: età 10-14.
Micali et al., 2013

Tasso grezzo di mortalità (morti/1000/anno): AN: 5,1; BN: 1,7; Altri DA 3,3
Alta frequenza di suicidio (1/5 delle morti in caso di AN)
Arcelus et al., 2011

Adolescenza: periodo di transizione

L'Adolescenza costituisce una finestra fondamentale nello sviluppo umano, seconda per importanza solo alla prima infanzia

Transizioni significative:

- ❖ Funzionamento Neurologico
- ❖ Funzionamento Cognitivo
- ❖ Regolazione Emotiva
- ❖ Relazioni Interpersonali
- ❖ Sviluppo sessuale

Sviluppo cerebrale dell'adolescente

- “Pruning” selettivo postero-anteriore connesso al contesto sociale
- Mielinizzazione: passaggio dal pensiero rappresentativo a forme complesse di elaborazione dell'informazione (Capacità Metacognitive)
- Maturazione cerebrale connessa all'aumentata capacità di Regolazione Affettiva e Cognitiva

Adolescenza e Sviluppo Cerebrale

- “Potatura” selettiva postero-anteriore connesso al contesto sociale
(*Frontalizzazione*)
- Mielinizzazione: passaggio dal pensiero rappresentativo a forme complesse di elaborazione dell’informazione (*Capacità Metacognitive*)
- Maturazione cerebrale connessa all’aumentata capacità di *Regolazione Emotiva e Cognitiva*

Kendall Powell, 2006: “Neurodevelopment: How does the teenage brain work?”
Nature 442, 865-867

Covid-19 e disagio psicologico negli adolescenti

Psychiatry Research 291 (2020) 113264

ELSEVIER

Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

Psychiatry Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/psychres

Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown

Sélim Benjamin Guessoum^{a,b,c,*,#}, Jonathan Lachal^{a,b,c,#}, Rahmeth Radjack^{a,c,#},
Emilie Carretier^{a,b,c,#}, Sevan Minassian^{a,#}, Laelia Benoit^{a,b,c,#}, Marie Rose Moro^{a,b,c,#}

^a Greater Paris University Hospital, University Hospital Cochin, Maison des Adolescents - Youth Department, F-75014 Paris, France

^b University of Paris, PCPP, F-92100 Boulogne-Billancourt, France

^c University Paris-Saclay, UVSQ, Inserm, CESP, Team DevPsy, F-94807, Villejuif, France

Fattori di rischio

- Aumento eventi stressanti/traumatici
- Confinamento forzato a casa
- Lutti
- Abuso di Internet & Social media

Covid-19 e disagio psicologico negli adolescenti

Psychiatry Research 291 (2020) 113264

Contents lists available at ScienceDirect

Psychiatry Research

journal homepage: www.elsevier.com/locate/psychres

Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown

Sélim Benjamin Guessoum^{a,b,c,*}, Jonathan Lachal^{a,b,c,#}, Rahmeth Radjack^{a,c,#},
Emilie Carretier^{a,b,c,#}, Sevan Minassian^{a,#}, Laelia Benoit^{a,b,c,#}, Marie Rose Moro^{a,b,c,#}

^a Greater Paris University Hospital, University Hospital Cochin, Maison des Adolescents - Youth Department, F-75014 Paris, France

^b University of Paris, PCPP, F-92100 Boulogne-Billancourt, France

^c University Paris-Saclay, UVSQ, Inserm, CESP, Team DevPsy, F-94807, Villejuif, France

- PTSD
 - Effetti negativi sullo sviluppo dei circuiti fronto-limbici
 - Riduzione del volume ippocampale, aumento attività amigdala e riduzione della connettività fronto-amigdaloidea
 - ↑ Disregolazione emotiva (confusione, vulnerabilità, rabbia)
- Ansia: + 32% (Zohu et al, 2020)
- Depressione: + 43% (Zohu et al, 2020)
- Pensiero suicidario: (Ammerman et al., 2021)
- Abuso sostanze (cannabinoidi) (Guessoum et al., 2020)

Internet & Social Media al tempo del Covid-19

La pandemia COVID-19 si inserisce in un contesto sociale e tecnologico nuovo, mai sperimentato prima

Aspetti positivi

Mantenimento livelli di socializzazione
Accesso all'informazione e alla comunicazione
Possibilità di accesso alle cure
Mantenimento della didattica

ma...

Aspetti negativi

Ansia, depressione e distress emotivo *(Keles et al., 2020)*
Disturbi del sonno *(Shaw & Black, 2008)*
Internet addiction *(Cerniglia, 2017)*
Accesso a informazioni senza filtro *(Quarantine 15)*
Solitudine percepita

Isolamento e alimentazione

Alcune aree cerebrali (Substantia Nigra e Area Ventro-Tegmentale) appaiono coinvolte nel *craving*

L'attivazione di tali aree mostra un andamento analogo nell'isolamento forzato e nel digiuno

In adolescenza l'attivazione di queste aree cerebrali è meno modulata dalle aree corticali superiori (CPF, Gangli della Base, sistema dopaminergico) ancora in via di sviluppo. Inoltre, l'iperattivazione di queste aree interferisce con il fisiologico sviluppo cerebrale (Sturman & Moghaddam, 2011)

Esperienza interpersonale e sviluppo cerebrale

The role of experience in adolescent cognitive development: Integration of executive, memory, and mesolimbic systems (*Neurosci. & Biobehav.Rev.*, 70, 46–58. Murty, Calabro & Luna, 2016)

Impatto della pandemia COVID-19 sul rischio di DA

Received: 25 April 2020 | Revised: 17 May 2020 | Accepted: 17 May 2020

DOI: 10.1002/eat.23318

AN IDEA WORTH RESEARCHING

International Journal of
EATING DISORDERS WILEY

The impact of the COVID-19 pandemic on eating disorder risk and symptoms

Rachel F. Rodgers PhD^{1,2,3} | Caterina Lombardo PhD³ | Silvia Cerolini PhD³ |
Debra L. Franko PhD¹ | Mika Omori PhD⁴ | Matthew Fuller-Tyszkiewicz PhD⁵ |
Jake Linardon PhD⁵ | Philippe Courtet MD, PhD² | Sebastien Guillaume MD, PhD²

UOSD DCA ASL Roma1

Valutazioni 18 mesi pre/post
1° Lockdown Covid 19 (marzo-maggio 2020)

LA CURA

UOSD
DCA

Nella cura dei DCA devono essere coinvolte figure professionali e modelli teorici diversi

Gli interventi compiuti da specialisti diversi possono portare a una frammentazione o all'integrazione della cura

I livelli di intervento

- Età
- Durata di malattia
- Gravità di malattia (*intensità di cura*)
 - ✓ Livello Ambulatoriale
 - ✓ Day Hospital
 - ✓ Intervento Riabilitativo
 - ✓ Ricovero Ospedaliero

Intervento Terapeutico Multiprofessionale

Il Livello Ambulatoriale Specialistico

È il livello centrale del trattamento dei DA, snodo principale nella definizione dei programmi terapeutici

Centro a diretto contatto sia con il territorio sia con le altre strutture sanitarie specifiche: svolge funzione di filtro per i successivi livelli terapeutici

Articolazione Multidisciplinare

Gli interventi altamente strutturati e intensivi hanno esiti migliori (psicoterapici, farmacologici, riabilitativi e psicoeducativi)

L'accesso al livello ambulatoriale dei pz "gravi"

Cosa ci dicono le Linee Guida

- Sono necessari diversi livelli di assistenza (Ambulatorio, Trattamento Riabilitativo Semiresidenziale, Residenziale, Ospedalizzazione per l'acuzie)
- È necessario che siano tutti disponibili e coordinati tra loro
- L'**ambulatorio** rimane l'intervento privilegiato, e deve potere avere a sua disposizione altri presidi qualora si renda necessario un intervento più intensivo

UOSD
DCA

Modello Hub & Spoke

Le Linee Guida suggeriscono

- 1 ambulatorio di accesso per DA ogni 30.000 abitanti (MMG, PLS, CSM o Ambulatori Età Evolutiva) (spoke)
- 1 U.O. Dedicata (Hub) articolata in
 - Ambulatorio Multiprofessionale Integrato,
 - Possibilità di “day-care” (Ambulatorio Intensivo)
 - Struttura Residenziale di almeno 8 posti letto ogni 1.000.000 di abitanti
- Team Multidisciplinare

19

Richards L. (2013)¹⁹ in *Handbook of Eating Disorders*, edited by J. Trasare, U. Schmidt e E van Furth; NICE, 2004

Trattamento Multi-Step Integrato

Fase della Preparazione

Fase 1

Fase 2

Aspetti specifici del DA

Perfezionismo Clinico

Distorsione dell'Immagine Corporea

Bassa Autostima

Intolleranza alle Emozioni

Difficoltà Interpersonali

Coinvolgimento dei Familiari (pazienti < 18 anni)

Per corso Ambulatoriale Intensivo

UOSD DCA ASL Roma1

La situazione nel Lazio

DCA Regione Lazio n° 80 del 14 marzo 2016 Ampiamente disatteso...

- 3 strutture residenziali accreditate (poco integrati con gli altri servizi esistenti)
- UOS DCA Bambino Gesù (DH + Ambulatorio + letti ospedalieri dedicati)
- UOSD DCA ASL Roma1 (Ambulatorio Multiprofessionale + Residenza - CD - Ambulatorio spoke di prossima apertura)
- UOSD DCA ASL Roma2 (Ambulatorio Multiprofessionale over 18)
- Osp. Gemelli (Servizio dedicato)

UOSD DCA ASL Roma1

Distribuzione Diagnosi

Periodo 2009-2021, n° 1993